A. Árvores Binárias de Pesquisa (ABP)

// Pergunta 1

int existeElemento (int X, PNodeABP T)

```
{  
    if (T == NULL)  
        return 0;  
    if (X == T->Elemento)  
        return 1;  
    if (X < T->Elemento)  
        return existeElemento(X, T->Esquerda);  
    else  
        return existeElemento(X, T->Direita);  
}
```

// Pergunta 2 - versão 1

PNodeABP paiNodeMenorMaiorX (PNodeABP T, PNodeABP pai, int X)

```
{  
    PNodeABP PEsq;  
    if (T == NULL)  
        return NULL;  
    if (T->Elemento > X)  
        if (T->Esquerda == NULL)  
            return pai;  
        else {  
            PEsq = paiNodeMenorMaiorX(T->Esquerda, T, X);  
            if (PEsq != NULL)  
                return PEsq;  
            else  
                return pai;  
        }  
    else  
        return paiNodeMenorMaiorX(T->Direita, T, X);  
}
```

NOTA: na primeira chamada desta função, o argumento pai recebe NULL.

// Pergunta 2 - versão 2

PNodoABP paiNodoMenorMaiorX_2 (PNodoABP T, int X)

```
{
    PNodoABP P;

    if (T == NULL)
        return NULL; // só acontece para T original vazia

    if (T->Elemento <= X) {
        if (T->Direita == NULL)
            return NULL; // todos os elementos são <= X
        if (T->Direita->Elemento > X)
            if (T->Direita->Esquerda == NULL) // T->Direita->Elemento é o menor dos maiores que X
                return T; // T é o pai no menor dos maiores que X
            else {
                P = paiNodoMenorMaiorX_2(T->Direita, X);
                if (P == NULL) // o menor dos maiores que X é a raiz da T->Direita
                    return T; // e o seu pai é T
                else
                    return P;
            }
        else
            return paiNodoMenorMaiorX_2(T->Direita, X);
    }

    if (T->Elemento > X) {
        if (T->Esquerda == NULL)
            return NULL; // a raiz principal é o menor dos maiores que X
        if (T->Esquerda->Elemento > X)
            if (T->Esquerda->Esquerda == NULL) // T->Esquerda->Elemento é o menor dos maiores que X
                return T; // T é o pai no menor dos maiores que X
            else {
                P = paiNodoMenorMaiorX_2(T->Esquerda, X);
                if (P == NULL) // o menor dos maiores é a raiz da T->Esquerda
                    return T; // e o seu pai é T
                else
                    return P;
            }
        else
            return paiNodoMenorMaiorX_2(T->Esquerda, X);
    }
}
```

B. ABP Balanceadas/Equilibradas (AVL)

Inserir **30**, **70** e **50**, por esta ordem:

A árvore fica **equilibrada** com a inserção dos nodos **30** e **70**

A árvore fica **desequilibrada** com a inserção do nodo **50**

O **desequilíbrio** acontece na árvore com raiz no nodo **30**, pois

- o seu filho direito (nodo **70**) tem altura 2
- o seu filho esquerdo (NULL) tem altura 0
- altura(filho direito) - altura(filho esquerdo) = 2 - 0 = 2

Todas as subárvores com raiz nos nodos descendentes do nodo **30** estão equilibradas

Como

- o filho **direito** do nodo **30** (nodo **70**) tem **mais altura** que o filho esquerdo do nodo **30** (**NULL**), e
- o filho **esquerdo** do nodo **70** (nodo **50**) tem **mais altura** que o filho direito do **70** (**NULL**),

então **reequilibrar** a árvore aplicando uma **rotação dupla à esquerda**, usando o nodo **50**

1º) **rotação simples à direita** do nodo **70** usando o nodo **50**:

2º) **rotação simples à esquerda** do nodo **30** usando o nodo **50**:

A árvore está equilibrada.

Inserir **20**, **40** e **25**, por esta ordem:

A árvore fica equilibrada com a inserção dos nodos **20** e **40**

A árvore fica **desequilibrada** com a inserção do nodo **25**

O **desequilíbrio** acontece na árvore com raiz no nodo **50**, pois

- o seu filho esquerdo (nodo **30**) tem altura 3
- o seu filho direito (nodo **70**) tem altura 1
- altura(filho esquerdo) - altura(filho direito) = 3 - 1 = 2

Todas as subárvores com raiz nos nodos descendentes do nodo **50** estão equilibradas

Como

- o filho **esquerdo** do nodo **50** (nodo **30**) tem **mais altura** que o filho direito do nodo **50** (nodo **70**), e
 - o filho **esquerdo** do nodo **30** (nodo **20**) tem **mais altura** que o filho direito do nodo **30** (nodo **40**),
- então **reequilibrar** a árvore aplicando uma **rotação simples à direita** do nodo **50** usando o nodo **30**

A árvore está equilibrada.

Inserir **45**:

A árvore está equilibrada.

Remover o nodo **20**:

como o nodo **20** tem apenas um filho, a remoção deste nodo consiste nos dois passos seguintes:

- ligar o nodo **30** ao nodo filho de **20** (nodo **25**), através da sua ligação esquerda (filho esquerdo do nodo **30** passa a ser o nodo **25**)
- remover o nodo **20**

A árvore fica **desequilibrada** com a remoção do nodo **20**

O **desequilíbrio** acontece na árvore com raiz no nodo **30**, pois

- o seu filho direito (nodo **50**) tem altura 3
- o seu filho esquerdo (nodo **25**) tem altura 1
- altura(filho direito) – altura(filho esquerdo) = 3 - 1 = 2

Todos as subárvores com raiz nos nodos descendentes do nodo **30** estão equilibradas

Como

- o filho **direito** do nodo **30** (nodo **50**) tem **mais altura** que o filho esquerdo do nodo **30** (nodo **25**), e
- o filho **esquerdo** do nodo **50** (nodo **40**) tem **mais altura** que o filho direito do nodo **50** (nodo **70**),

então **reequilibrar** a árvore aplicando uma **rotação dupla à esquerda** do nodo **30**

1º) **rotação simples à direita** do nodo **50** usando o nodo **40**:

2º) **rotação simples à esquerda** do nodo **30** usando o nodo **40**:

C. Heaps

1.

1º Extrair/tomar o elemento que se encontra na raiz do minHeap: **2**

2º Remover o nó que se encontra na raiz da árvore, da seguinte forma:

- a) copiar para a raiz (com valor 2) o elemento do nodo mais à direita do último nível do minHeap (com valor 9) e remover este último nodo

- b) repor as propriedade de minHeap: comparar o nodo com valor 9 (agora raiz) com o menor (melhor) dos seus filhos e, caso seja maior (pior) do que esse filho, então trocá-los; fazer isto até o nodo com valor 9 ser menor (melhor) que os seus filhos ou atingir o último nível do minHeap:

- i) como $9 > 4$ ($4 = \min\{4, 8\}$) (pior que o melhor dos seus filhos), então trocar o elemento com valor 9 pelo elemento com valor 4

- ii) como $9 > 5$ ($5 = \min\{5, 7\}$) (pior que o melhor dos seus filhos), então trocar o elemento com valor 9 pelo elemento com valor 5

- iii) como o nodo 9 não tem filhos, então terminar processo.

2.

a) inserir um nodo com o valor **6** como filho esquerdo do nodo com o valor **8**

b) comparar o nodo com o valor **6** com o seu pai, e caso tenha menor (melhor) valor trocá-los. Fazer isto até um nodo com valor **6** ter valor maior (pior) do que o seu pai ou chegar à raiz da minHeap:

i) como $6 < 8$ (melhor que o seu pai), então trocá-los

ii) como $6 > 4$ (pior que o seu pai), então parar o processo.

D. Grafos

1.

	destino/custo					
1	3	-->	2/5	4/10	6/8	
2	3	-->	1/5	3/20	4/4	
3	4	-->	2/20	5/6	6/14	8/2
4	3	-->	1/10	2/4	5/3	
5	2	-->	3/6	4/3		
6	3	-->	1/8	3/14	7/5	
7	2	-->	6/5	8/15		
8	2	-->	3/2	7/15		

2.

Passo 1:

$$S = 5$$

	1	2	3	4	5	6	7	8
R	∞	∞	6	3	0	∞	∞	∞
Pai	-	-	5	5	5	-	-	-

Permanentes $\leftarrow$ 5

Temporários $\leftarrow$ 1 - 2 - 6 - 4 - 7 - 3 - 8

Passos 2 e 3:

	1	2	3	4	5	6	7	8
R	∞ 10 5	∞ 4	6	3	0	∞ 8	∞ 15 5	∞ 2
Pai	- 4 2	- 4	5	5	5	- 1	- 8 6	- 3

Permanentes $\leftarrow$ 5 - 4 - 2 - 1 - 3 - 8 - 6 - 7

Temporários $\leftarrow$ **1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8**

k $\leftarrow$ **4** ---> $R(4) = 3 =$ mínimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 4 passa a Permanente)

Temporários $\neq \emptyset \Rightarrow$ Continuar

j $\leftarrow$ **1, 2, 5** (adjacentes ao nó 4)

1: $C(4,1) < R(1)$?

$$10 < \infty \text{ SIM } \Rightarrow \mathbf{R(1) = 10 \text{ e Pai(1) = k = 4}}$$

2: $C(4,2) < R(2)$?

$$4 < \infty \text{ SIM } \Rightarrow \mathbf{R(2) = 4 \text{ e Pai(2) = k = 4}}$$

5: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

$k \leftarrow 2 \rightarrow R(2) = 5 = \text{minimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 2 passa a Permanente)}$

Temporários $\neq \emptyset \Rightarrow$ Continuar

$j \leftarrow 1, 3, 4$ (adjacentes ao nó 2)

1: $C(2,1) < R(1)$?

5 < 10 SIM $\Rightarrow R(1) = 5$ e $Pai(1) = k = 2$

3: $C(2,3) < R(3)$?

20 < 6 NÃO

4: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

$k \leftarrow 1 \rightarrow R(1) = 5 = \text{minimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 1 passa a Permanente)}$

Temporários $\neq \emptyset \Rightarrow$ Continuar

$j \leftarrow 2, 4, 6$ (adjacentes ao nó 1)

2: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

4: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

6: $C(1,6) < R(6)$?

8 < ∞ SIM $\Rightarrow R(6) = 8$ e $Pai(6) = k = 1$

$k \leftarrow 3 \rightarrow R(3) = 5 = \text{minimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 3 passa a Permanente)}$

Temporários $\neq \emptyset \Rightarrow$ Continuar

$j \leftarrow 2, 5, 6, 8$ (adjacentes ao nó 3)

2: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

5: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

6: $C(3,6) < R(6)$?

14 < 8 NÃO

8: $C(3,8) < R(8)$?

2 < ∞ SIM $\Rightarrow R(8) = 2$ e $Pai(8) = k = 3$

$k \leftarrow 8 \rightarrow R(8) = 2 = \text{minimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 8 passa a Permanente)}$

Temporários $\neq \emptyset \Rightarrow$ Continuar

$j \leftarrow 3, 7$ (adjacentes ao nó 8)

3: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

7: $C(8,7) < R(7)$?

15 < ∞ SIM $\Rightarrow R(7) = 15$ e $Pai(7) = k = 8$

$k \leftarrow 6 \rightarrow R(6) = 8 = \text{minimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 6 passa a Permanente)}$

Temporários $\neq \emptyset \Rightarrow$ Continuar

$j \leftarrow 1, 3, 7$ (adjacentes ao nó 6)

1: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

3: não pode ser rotulado, pois já é Permanente

7: $C(6,7) < R(7)$?

5 < 15 SIM $\Rightarrow R(7) = 5$ e $Pai(7) = k = 6$

$k \leftarrow 7 \rightarrow R(7) = 5 = \text{minimo entre os rótulos dos nós temporários (o nó 7 passa a Permanente)}$

Temporários $= \emptyset \Rightarrow$ PARAR

Árvore Abrangente Mínima determinada tomando o nó 5 com inicial ($S = 0$)=dos Caminhos Mais Curtos entre o nó 1 e todos os outros nós, é a seguinte:

3.

$$\begin{aligned} \text{Custo total da AAM} &= C(1,2) + C(1,6) + C(2,4) + C(4,5) + C(5,3) + C(6,7) + C(3,8) = \\ &= 5 + 8 + 4 + 3 + 6 + 5 + 2 = \mathbf{33} \end{aligned}$$